



**PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE
WITH THE PHARMACISTS' REGULATIONS
(PREPARATIONS) - 1986**

The medicine is dispensed with
a doctor's prescription only

MINIRIN NASAL SPRAY

Composition:

Desmopressin Acetate 0.1 mg/ml

Inactive ingredients - see section 6 "Further Information".

Read this leaflet carefully in its entirety before using the medicine. This leaflet contains concise information about the medicine. If you have further questions, refer to the doctor or pharmacist.

This medicine has been prescribed to treat your ailment. Do not pass it on to others. It may harm them even if it seems to you that their ailment is similar. This medicine is not usually intended for children and infants under 3 months of age.

1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED FOR?


Diabetes insipidus.

Therapeutic group: Synthetic vasopressin hormone substitute.

alternately (simultaneously block the other nostril with a finger). Rinse the tip of the spray bottle with warm water, taking care that the water is not drawn into the bottle. Dry with a clean paper tissue.

d. Return the protective cap after use.

If the spray has not been used for one week, it must be reactivated before placing the nozzle into the nostril, by pressing a few times until an even spray is achieved.



ATTENTION:


Do not swallow! This medicine is intended for external use only. For intranasal use only.

If you accidentally took an overdose, or if a child has accidentally swallowed the medicine, immediately refer to a doctor or proceed to a hospital emergency room and bring the package of the medicine with you.

If you forgot to take this medicine at the designated time, take a dose as soon as you remember, but never take two doses together!

إغسل فوهة البخاخ بواسطة ماء ساخن، لكن إحرص على ألا يتسرب ماء إلى داخل البخاخ. نظف بواسطة منديل ورقي نظيف.

د) بعد الإستعمال أعد الغطاء الواقي إلى مكانه. إذا لم يتم إستعمال البخاخ لمدة أسبوع، فهناك حاجة لتشغيله مجدداً بواسطة الكبس عليه عدة مرات، حتى الحصول على رذاذ متجانس، وذلك قبل إدخال الفوهة في المنخر.



إنتبه:
ليس للبلع! هذا الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط. للإستعمال داخل الأنف فقط.

إذا إستعملت بالخطأ مقدار دوائي مفرط أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالا للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبه الدواء معك.

إذا نسيت إستعمال هذا الدواء في الوقت المحدد، يجب إستعمال مقدار دوائي حال تذكرك بذلك؛ لكن لا يجوز في أي حال من الأحوال إستعمال مقدارين دوائيين سوية!